

CUIDADOS: EDODONCIA

ESTÉTICA DENTAL CENTER

1. PROTECCIÓN DE LA PIEZA (Vital)

El diente tratado ha perdido su hidratación natural y está hueco por dentro, lo que lo hace actuar como "cristal":

No masticar nada duro: Evite usar ese lado de la boca para comer nueces, tostadas, hielo o carnes fibrosas hasta que tenga su corona o restauración definitiva.

Restauración final: La endodoncia **no está terminada** hasta que se coloque la corona o incrustación. Postergar este paso aumenta el riesgo de fractura irreparable y pérdida del diente.

2. MOLESTIAS POST-TRATAMIENTO

Inflamación del ligamento: Es normal sentir dolor al morder o sensibilidad a la presión durante los primeros 3 a 5 días. Esto ocurre porque los tejidos alrededor de la raíz están sanando.

Encía sensible: La zona donde se colocó la anestesia o el aislamiento puede estar ligeramente inflamada o sensible.

3. CUIDADOS GENERALES

Medicamentos: Tome los antiinflamatorios recetados estrictamente a la hora indicada, incluso si no siente dolor intenso, para evitar que la inflamación aumente.

Higiene: Puede cepillarse normalmente y usar hilo dental con cuidado. Si tiene una **curación temporal** (cemento provisional), no pase el hilo dental hacia arriba; sáquelo lateralmente para no desprender el material.

CONTACTO DE EMERGENCIA

Escríbanos por WhatsApp si presenta:

1. Dolor agudo que no cede con la medicación después de 48 horas.
2. Inflamación visible en la encía o en el rostro (cachete).
3. Si la curación provisional se cae por completo (dejando el hueco abierto).

WhatsApp: 777 502 17 49